

NP3 - Studie

Nationale Postpartum Psychose Preventie Studie

Achtergrond

Vrouwen met in de voorgeschiedenis een bipolaire stoornis en/of een postpartum psychose hebben een sterk verhoogd risico op terugval peripartum, in het bijzonder op een postpartum psychose. Profylactische medicatie heeft een beschermende rol, maar moet worden afgewogen tegen de potentieel negatieve effecten op de foetus.

Doelen van het onderzoek

Het primaire doel van de studie is onderzoek naar psychiatrische terugval peripartum, in samenhang met het profylactische medicatiebeleid. De secundaire doelen van de studie zijn onderzoek naar obstetrische complicaties en neonatale uitkomsten in relatie tot psychofarmaca gebruik.

Welke patiënten?

Zwangere vrouwen met in de voorgeschiedenis een bipolaire stoornis en/of een postpartum psychose.

Wat houdt het onderzoek in?

- Het betreft een weinig belastende studie zonder interventies (observationeel).
- We vragen dossierinzage om het psychiatrische beloop te onderzoeken.
- Patiënten krijgen tijdens het laatste trimester van de zwangerschap en 3 keer postpartum een korte vragenlijst over de mail.
- Er vindt gemeenschappelijke werving plaats voor de NP3-studie en de SLAAPREG-BD studie van A. Stevens.

Aanmelden patiënt (vergt weinig inspanning van behandelaren):

1. Patiënten korte uitleg geven over de studie en toestemming vragen om te worden benaderd te worden door R. Wesseloo (arts-onderzoeker).

2. Tot slot vragen we of we eenmalig telefonisch contact mogen opnemen om informatie te winnen over het klinische beloop van de patiënte en het ingezette psychofarmaca beleid.

Voor vragen en informatie, neemt gerust contact op met:

- Richard Wesseloo, psychiater in opleiding / PhD-student
Mail: r.wesseloo@erasmusmc.nl Tel: 010-70 32 349 / 010-70 40 139

- Veerle Bergink, psychiater
Mail: v.bergink@erasmusmc.nl Tel: 010-70 40 139

Alle studie informatie (inclusief patiënt informatie formulier) is ook te vinden op:
http://www.psych.nl/aboutdisorders/np3_studie.html